ಫಿಪ್ರೋನಿಲ್ 0.3% ಜಿಆರ್ ಕೀಟನಾಶಕ

ಫಿಪ್ರೋನಿಲ್ 0.3% ಜಿಆರ್ ಇದೊಂದು ಫಿಪ್ರೋನಿಲ್ 0.3 ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯ ವಿವಿಧ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿನ ಅದಿಯ ಸುಳಿ ಕೊರಕ ಹಾಗೂ ಬೇರು ಕೊರಕಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉಪಯೋಗುಸುವ ಪ್ರಮಾಣ:

ಬೆಳೆ	ಕೀಟಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಸ.ಪ ಗ್ರಾ	ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಕ್ಟರಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಮಿ.ಲೀ.	ಬೆರೆಸಬೇಕಾದ ನೀರು ಲೀ	ಅಂತಿಮ ಸಿಂಪರಣೆ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲಿನ ಅವಧಿ ನಡುವಿನ ಕಾಯುವ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
ಕಬ್ಬು	ಅದಿಯ ಸುಳಿಕೊರಕ ಹಾಗೂ ಬೇರು ಕೊರಕ	75-100	25.0-33.0	-	270
ಭತ್ತ	ಕಾಂಡಕೊರಕ ಕಂದು ಗಿಡ ಮಿಡತೆ, ಭತ್ತದ ಎಲೆ ಸುರಳಿ ಹುಳು ಇತ್ಯಾದಿ	50-75	16.67-25.00	-	32

ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಉಪಕರಕಾದ: ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣದ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ ಎಪ್ಲಿಕೇಟರ್ ಇಲ್ಲವೇ ಡಿಸ್ಪನ್ಸರ್ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ 2-3 ಸೆಂ.ಮೀ. ನೀರು ನಿಂತರಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳ ವರಗೆ ನೀರು ಕಟ್ಟಡಬೇಕು.

ಫಿಪ್ರೋನಿಲ್ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕದ ವಿಷಕಾರಿತ್ವ:

ತೀವ್ರ ಮೌಖಿಕ ಎಲ್‌ಡಿ ೫೦(ಇಲಿ) – 97 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ./ಕೇಜಿ

ತೀವ್ರ ಚರ್ಮಾಂತರ್ಗತ ಎಲ್‌ಡಿ ೫೦ (ಇಲಿ) > 2000 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ./ಕೇಜಿ

ವಿಷ ತಗಲಿದೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ರೇಕ, ನಿರುತ್ಸಾಹ, ಸ್ನಾಯುಸೆಡೆತ ಹಾಗೂ ವಿಷಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಗ್ರನಡುಕ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಫಿಪ್ರೋನಿಲ್ ಒಂದು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಗಾಬಾ ರಿಸ್ಟರ್ ಇನ್‌ಹಿಬಿಟರ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೀಟನಾಶಕದ ಸಂಪರ್ಕ ತಡೆದಲ್ಲಿ ವಿಷತಗಲಿದೆ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಉಸಿರಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆಳೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ರೋಗಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯಾಡುವಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತನ್ನಿ. ಉಸಿರಾಡುವುದು ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದರೆ ಕೈಕತವಾಗಿ ಉಸುರಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗಂಟಲಿನ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ತಿಕ್ಕಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರಿಪಿಸಿ. ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸೋಂಕಿದ್ದರೆ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರಿನಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಚರ್ಮವು ಕಲುಶಿತಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ,

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ : ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಕೈಕೊಳ್ಳಿರಿ

ಮುಂಜಾಗ್ರತ್ತಗಳು : ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆಟಕದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ. ತ್ವಚೆಗೆ ತಗಲಬಾರದು. ಉಸಿರಿಂದ ಒಳಸೇರಬಾರದು. ಕೆಸಲವಾದೊಡನೆ ಹಾಗು ಉಟಮಾಡುವವೊದಲು ಕೈಕಾಲು ಹಾಗೂ ಕೀಟನಾಶಕ ತಗಲಿರುವ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನೂ, ಬಟ್ಟೆಬರೆಗಳನ್ನೂ ತನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಹೊಗೆಬತ್ತಿ ಸೇದಬಾರದು. ವೀಳ್ಯ ಹಾರಬಾರದು. ಕುಡಿಯುವುದಾಗಲೀ ತಿನ್ನವುದಾಗಲೀ ಮಾಡಬಾರದು.

ಸಂಗ್ರಹಣೆ : ಶುಷ್ಕ ಒಣ, ಕತ್ತಲೆ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು, ಜಾನುವಾರು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಗೂ ತೆರೆದ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ದೂರವಿಡಿರಿ.

ವಿಸರ್ಜನೆ : ಮಲೀನಗೊಳಿಸಿದಿರಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ೫ ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಡಾ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಸಿನವರೆಗೆ ಮುಳುಗಿಸಿ ಇಡಬೇಕು, ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಒಡದು ನಾಶಮಾಡಿ, ಜನವಸತಿಯಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ೧–೨ ಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಹೊಳಬೇಕು. ಉಳಿದ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದಿಡಬೇಕು.

ವಾರಂಟಿ : ಈ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ನಿಯಂತಕಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವದರಿಂದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಕಾರ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟಲಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಕವ ಕಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿನಾವು ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲೇಬಲ್ ಕರಪತ್ರ ದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಗಾಗಿ ಬಳಸಬಾರದು.

ఫిప్రోనిల్ 0.3% జిఆర్ క్రిమిసంహారిణి

ఫిప్రోనిల్ 0.3% జిఆర్, ఫిప్రోనిల్ 0.3% అనే మూలపదార్థం కలిగివున్న ఒక కీటకనాశని. వరి పంట నాశించే వివిధ రకాల కీటకాలను మరియు చెఱకు నాశించు పీక లేదా మొవ్వ చప్పు పురుగును వ్రేళ్ళుతొలుచు పురుగును శక్తివంతంగా అరికడుతుంది.

ఉపయోగించుటకు కొరకు సిఫారసులు :

పంట	తెగుళ్ల సాధారణ పేరు	ఎ.ఐ. (గ్రా.)	మోతాదు/హెక్టారు ఫార్ములేషన్ (మి.లీ.)	కలపవలసిన నీళ్లు (లీటర్)	చివరి స్ప్రే నుండి కోత కాలం వరకు వేచివుండాల్సిన రోజులు
చెఱకు	పీక లేదా మొవ్వచప్పు పురుగు వేళ్ళు, తొలుచు పురుగు	75-100	25.0-33.0	-	270
వరి	కాండము తొలుచు, దోమపోటు, ఆకుముడత, ఉల్లికోడు, కోల్ మగ్గట్, తెల్లని మిడతపురుగు	50-75	16.67-25.00	-	32

వాడే విధానము మరియు వాడవలసిన పరికరాలు: సిఫారసు చేయబడిన మోతాదులోగల ఘుళికలను జల్లుటకై చేతిలో నిర్వహించే గ్రాన్యూల్ అప్లికేటర్ లేదా మెకానికల్ డిస్పెన్సర్‌ను వాడాలి. వరిపంటలో వీటిని చల్లేటప్పుడు పంటలో 2-3 సెం.మీ. వరకు నీరు వుండాలి. చల్లిన పిదప ఆ నీటిని 2-3 రోజులు అలాగే నిల్వచేసి వుండాలి.

విషకారిత్వం :

ఎక్యూట్ ఓరల్ ఎల్.డి. 50 (ఎలుక) - 945 మి.గ్రా. కి.గ్రా.

ఎక్యూట్ డెర్మల్ ఎల్.డి. 50 (ఎలుక) > 2000 మి.గ్రా. కి.గ్రా.

విష లక్షణములు : ముఖ్యంగా చిరాకుగా వుండటం, బాగా అలసి పోయినట్లుండటం, కండరాలు వొణకడం, మరీ విషమిస్తే మెలిక తిరిగిపోవడం జరుగుతుంది. ఇందుగల ఫిప్రోనిల్ అనే పదార్థంలో జిఎబిఎ అనే ఆటంకపర్చే గుణముమబట్టి విషలక్షణాలు కనబడినప్పటికే వాటిని తిరిగి కొట్టివేయగల సమర్థత కల్గి వుంది.

ప్రథమ చికిత్స : ఈ రసాయన పదార్థమును ముక్కుతో పీల్చిన ఎడల రోగిని వెంటనే బయట గాలివీచు ప్రదేశమునకు తరలించండి. శ్వాస ఆగిన కృత్రిమ శ్వాసక్రియను చేయండి. మ్రింగిన ఎడల గొంతుకలో వ్రేలితో కెలికి వాంతి చేయుటకు ప్రోత్సహించండి. ఎక్కువ నీటితో కళ్ళను కడగండి. చర్మము కలుషితమైన సందర్భంలో సబ్బు మరియు ఎక్కువ నీటితో కడగండి.

విరుగుడు : లక్షణాలను బట్టి రోగికి సహాయకరంగా ఉండేలా చికిత్స జరపండి.

ముందు జాగ్రత్తలు : పిల్లలకు దూరంగా అందని చోట బద్రపరచాలి. చర్మంపై పడనీయరాదు. శ్వాసద్వారా పీల్చరాదు. పనిముగించిన తర్వాత భోజనానికి ముందు మందు గురి అయిన శరీర బాగాలను శుభ్రంగా కడగండి. దుస్తులను ఉతుక్కోవాలి. ఈ మందుమ వాడే సమయంలో పొగ త్రాగడం, కిళ్ళీ వేసుకోవడం, తినటం, త్రాగడం చేయరాదు.

నిల్వచేయుట : చల్లని పొడిగా ఉండే ప్రదేశంలో చక్కగా గాలి వెలుతురు వచ్చేచోట తాళం వేసి బద్రపరచాలి. తినుబండారాలకు, పిల్లలకు, పెంపుడు జంతువులకు దూరంగా ఉంచాలి.

ఖాళీ డబ్బాలను పారవేయుట : ఖాళీ అయిన డబ్బాలు వాడిన ప్రదేశములో వదిలివేయరాదు, తిరిగి వాడరాదు. వాడిన వాటిని నాశనం చేయాలి. జన సమర్థానికి దూరంగా భూగర్భజలాలు వాడకం లేని ప్రదేశాలలో వాటిని పాతిపెట్టాలి.

వారంటీ : అధికారకంగా ఆమోదించబడిన ప్రవేటు టెస్టుల ఆదారంగా ఇందులోని వివరాలు సదుదేశంతో ఇవ్వబడ్డాయి. అయినప్పటికీ కీటకనాశిని మందు పదార్థపు నిల్వ, వాడకపు పద్ధతులు ప్రయోగం మా అదుపులో లేనందువల్ల దీన్ని వాడకం మూలంగా ఏర్పడే ఎలాంటి కంపనీ భాద్యత వహించజాలదు.

గమనిక : ఈ లేబుల్ లీఫ్‌లెట్‌లో నిర్దేశించబడ్డ పంటలకు తప్ప మరి దేనికీ వాడరాదు.

ফিপ্রোনীল ০.৩% জি (কীটনাশক)

ফিপ্রোনীল ০.৩% জি একটি কীটনাশক যাতে থাকে ফিপ্রোনীল ০.৩% এবং এটি ধানের বিভিন্ন পোকামাকড় এবং আখের আরলি সুট বোরার দমনে ব্যবহৃত হয়।

ব্যবহারের মাত্রা :

ফসল	পোকার সাধারণ নাম	মাত্রা এ.আই. (গ্রাম)	ফরমুলেশনের জন্য (মিলিলি.)	প্রতি হেক্টরে ওষুধের জলে মিশ্রণ (লিটার)	শেষ স্প্রে এবং ফসল কাটার মধ্যে ব্যবধান (দিন)
ধান	স্টেম বোরার ব্রাউন প্লান্ট হপার, পাতা মোড়া পোকা	৫০-৭৫	১৬.৬৭-২৫.০	৫০০	৩৬
আখ	আরলি সুট বোরার রুট বোরার	৭৫-১০০	২৫.০-৩৩.৩	৫০০	২৭০

ব্যবহারের পদ্ধতি: এবং যন্ত্রপাতি অনুমোদিত মাত্রার দানাদার ওষুধ জমিতে ছড়ানো হয় হস্তচালিত গ্র্যানুউল আপলিকেটর বা মেকানিকাল ডিসপেনসর দিয়ে। ধানের ক্ষেত্রে জমিতে ২-৩ সেমি. জল থাকতে হবে। ওষুধ ছড়ানোর পর ২-৩ দিন জমিতে জল ধরে রাখুন।

ফিপ্রোনীলের টক্সিসিটি:

অ্যাকুউট ওরাল এলডি-৫০ (ইঁদুরের ক্ষেত্রে) - ৯৭ মিগ্রা/কেজি।

অ্যাকুউট ডার্মাল এলডি-৫০ (ইঁদুরের ক্ষেত্রে) - ২০০০ মিগ্রা/কেজি।

সংরক্ষণ : ওষুধের পাত্রগুলি একটি পৃথক ঘরে সংরক্ষণ করতে হবে যেখানে একটি আলমারীতে তালা-চাবি দিয়ে ওষুধটি রাখবেন। শিশুদের, খাদ্যবস্তুর, গৃহপালিত পশুর খাদ্যর থেকে দূরে রাখুন। ঘরটি যাতে ভালোভাবে তৈরী হয়, বায়ু চলাচল করে এবং পরিসর বড় হয়।

খালি পাত্রগুলি কি করবেন: খালি পাত্রগুলি নষ্ট করে মাটিতে পুঁতে ফেলুন যেখানে জনবসতি বা জলের উৎস নেই। খালি পাত্রগুলি এমনভাবে নষ্ট করতে হবে যাতে সেগুলি জল বা পরিবেশ দূষণ ঘটাতে না পারে। খালি বোতলগুলি জমিতে ফেলে রাখবেন না যাতে সেগুলি পুনর্ব্যবহার না হয় সেদিকে নজর রাখুন।

সতর্কতা : ওষুধ ব্যবহারের সময় ধূমপান, পান খাওয়া, তামাক সেবন করা চলবে না। শরীরের যেখানে ওষুধ লাগবে সেই জায়গা সাবান ও জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। খাওয়ার আগে হাত সাবান ও জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে নিন।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ : জ্বালা জ্বালা ভাব, অবসন্নভাব, পেশীর সঙ্কোচন, কনভালসান দেখা যেতে পারে । ফিপ্রোনীল একটি রিভার্সিবেল জি.এ.বি.এ. রিসেপ্টার ইনহিবিটার তাই এই লক্ষণগুলি এক্সপোজার পেলে বন্ধ হয়ে যায়।

প্রাথমিক চিকিৎসা : পেটে ওষুধ প্রবেশ করলে রোগীকে তৎক্ষণাৎ খোলা বাতাস চলাচল করে এমন জায়গায় নিয়ে যান। যদি শ্বাস বন্ধ হয়ে যায় তবে কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস দিন। গলায় আঙুল দিয়ে রোগীকে বমি করান। চোখে প্রচুর পরিমাণে জলের ঝাপটা দিন। চামড়ায় ওষুধ লাগলে সাবান ও জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

এন্টিডোট : কোনো নির্দিষ্ট এন্টিডোট নেই। রোগীর লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করুন।

ওয়ারেন্টি : এই লিটারেচারে নির্দিষ্ট এবং উল্লিখিত বিষয়গুলি প্রাইভেট পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রাপ্ত। তৎসত্ত্বেও, এই ওষুধ ব্যবহারে কোনো ক্ষতি হলে আমরা দায়বদ্ধ থাকব না, কারণ সংরক্ষণ বা ওষুধ ব্যবহারে আমাদের কোনো হাত থাকে না।

READ INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE

INDORAMA

PROSPO-GR

FIPRONIL 0.3% G.R.

INSECTICIDE

प्रोस्पो-GR

फिप्रोनिल ०.३% जी.आर.

कीटनाशक

In case of any complaints
kindly write to The Manager CRM,
Indorama India Private Limited
Ecocentre, EM-4, 12th Floor, Unit No. ECSL-1201,
Sector V, Salt Lake, Sech Bhawan,
North 24 Parganas, West Bengal – 700091, INDIA
Email: shaktiman@in.indorama.com,
Toll Free No. 1800 180 5244

Marketed by:
INDORAMA INDIA PRIVATE LIMITED
Ecocentre, EM-4, 12th Floor,
Unit No. ECSL-1201, Sector V,
Salt Lake, Sech Bhawan, North 24 Parganas,
West Bengal – 700091, INDIA

विपणनकर्ता :
इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
इकोसेंटर EM-4, 12वीं मंजिल
यूनिट नं० ECSL 1201, सेक्टर–5,
सॉल्ट लेक, सच भवन, नार्थ 24 परगना,
पश्चिम बंगाल –700091, भारत

Manufactured By
Samarthman Agro Chem Ltd.
(An ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015 Company)
Plot No. 853, Village Parakhandauli,
Deva Road, Barabanki- 225123(U.P)

निर्माता:
मै. समर्थमान एग्रो केम लिमिटेड
(An ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015 Company)
प्लाट नं. 853, गांव पाराखंदुली देवा रोड,
बाराबंकी - 225123 (उ.प्र.)

Fipronil 0.3% GR INSECTICIDE

Fipronil 0.3% GR is an insectcide containing Fipronil 0.3% for the control of rice pest complex and early shoot borer and root borer in Sugarcane

Recommendations for Use :

CROP	Common Name of Pests	DOSAGE PER HECTARE a.i. (g)	Formulation (kg)	Dilution in water (Litre)	Waiting period in days from last spray to harvest
Sugarcane	Early shoot borer & Root borer	75-100	25.0-33.0	-	9 months
Rice	Green Leaf hopper, Brown Plant Hopper, Stem Borer, Rice Leaf Folder, Rice Gall Midge, Whorl maggot, White backed Plant hopper	50-75	16.67-25.00	-	32 days

Methods of application and equipments for use : Recommended dosage for granules should be broadcasted using hand operated granule applicator or mechanical dispenser. For application in Paddy, 2-3cm standing water should be available in the field. Keep water impounded for 2-3 days after application.

Toxicity : Acute oral LD 50 (Rat) - 97 mg/Kg
Acute dermal LD50 (Rat) >2000 mg/Kg

Symptoms of Poisoning : Mainly consists of irritability, lethargy, muscle tremors and in extreme cases. Possibly convulsions may occur. Fipronil is a reversible GABA receptor inhibitor and these symptoms are reveroibis after termination of exposure.

First Aid : If the chemical is inhaled get the victim into fresh air immediately. If breathing has stopped give artificial respiration. Induce vomiting if swallowed by tickling back of the throat. Flush the eyes with plenty of clean water. In case of Skin contamination wash thoroughly with soap and plenty of water.

Antidote : No specific antidote. Give symptomatic and supportive therapy.

STORAGE : 1. The pesticides shall be stored in a separate room or premises from the rooms or premises meant for storing the food particularly other articles of food. Shall be kept in separate almirah under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticide. 2. the room premises meant for storing the insecticide shall be well constructed dimension to avoid contact with vapor.

DISPOSAL OF CONTAINERS : 1. Packages shall be broken and buried away from habitation. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.3. Packages or surplus material, washing from the machine and containers should be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental pollution.

PRECAUTIONS BY USER : 1. Avoid inhalation and skin contact while diluting because of spillage or splashes. Do not mix bare hands. 2. The user should use full protective clothing like rubber gloves, gumboots, googles, gasmask, apron and hood hat. 3. Use in high concentration with low and ultra low volume. Application is dangerous and should be avoided.

WARRANTY : The recommendations made in this literature are offered in good faith based on the results of officially approved private tests. However, no responsibility will be accepted by us for any injury or damage arising from the use of our product as we cannot exercise any control over storage, handling or application.

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

फिप्रोनिल ०.३% जीआर कीटनाशक

फिप्रोनिल ०.३% जीआर एक कीटनाशक है, जिसमें सक्रिय तत्व के रूप में फिप्रोनिल ०.३ह है। इसकी सिफारिश धान में लगने वाले कीडों और गन्ने में तना छेदक के नियंत्रण के लिए की गयी है।

इस्तेमाल हेतु सिफारिशें :

फसल	कीड़ो का सामान्य नाम	मात्रा प्रति हैक्टर ए.आई. (सक्रियतत्व) (ग्रा)	फॉम्युलेशन (मि.ली.)	पतला करने के लिए जरूरी पानी (लीटर)	आखिरी छिड़काव तथा कटाई के बीच अंतर (दिनों में)
ऊस	प्रारंभीचा शेंडा पोखरणारी व मूळ पोखरणारी	७५-१००	२५.०-३३.०	-	२७०
भात	खोड किडा तपकिरी तुडतुडे पाने गुंडाळणाऱ्या अळ्या	५०-७५	१६.६७-२५.००	-	३२

प्रयोग की विधि और उपयोग के लिए सामग्री : शिपारिस की गई दानेदार की मात्रा को हाथों से चलनेवाले दानेदार एप्लिकेटर या याँत्रिक डिस्पेन्सर से बिखेरना चाहिए। धान के फसलों में इसका प्रयोग करते समय २-३ सें.मी. पानी खड़ा रहने दीजिए। पानी को २-३ दिन तक रहने दीजिए।

विषलापानः यूही के लिये तीव्र मूशिक LD50 - ९४५ मि.ग्रा/कि.ग्रा त्वचा से तीव्र क्षाषण की LD50 (मूशिक) >२०००मि.ग्रा/कि.ग्रा.

जहर चढ़ने के लक्षण : मुख्यतः चिड़चिड़ापन,उदासी, मौसपेशियों में ऐंठन, अत्यधिक प्रकोप की अवस्था में दौरे पड़ने की सम्भावनाएँ हो सकती हैं। फिप्रोनिल गाबा रिसेप्टर अवरोधक है एवं इस कीटनाशक से सम्बन्ध हटाते ही उपरोक्त लक्षण समाप्त हो जाते हैं और प्रभावित व्यक्ति पूर्वावस्था में आ जाता हैं।

प्राथमिक उपचार : प्रभावित व्यक्ति को तुरन्त ताजी हवा में ले जाएं। यदि दम रूक रहा हो तो कृत्रिम सांस गें. निगले दाने पर गले में उंगली डाल कर उल्टी कराने की कोशिश करें. ढेर सारे साफ पानी से आंखो को अछ्छी तरह छपछपाएं. त्वचा में लग गया हो तो साबुन और खूब पानी से त्वचा को अच्छी तरह धोएं.

प्रति विषः लक्षणो के अनुसार चिकित्सा करों।

सावधानियाँः बच्चों की पहुँच से दूर रखे त्वचा पर लगने तथा पेट में जाने से बचाए। काम पूरा हो जानि व खाने से पहले हाथों, शरीर के खुले हिस्सों और कपडों को अच्छी तरह धो लें. दवा का इस्तेमाल करते समय न तो कुछ खाए-पीए और न ही पान चबाएं या धुम्रपान करें.

भंडारण : कीटनाशक को खाद्य पदार्थो, बच्चों, पालतु जानवरो एवं आग से दूर अन्यत्र कमरे में ठंडी, सुखी, अंदेरे युक हवादार जगह मे भंडार करें।

खाली डिब्बो को नष्ट करना : पैंकिग को थोडकर जमीन मे १ से २ मीटर की गहराई पर शहरी क्षेत्र दूर जलाए। बचे पदार्थ को सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दे ता कि वातावरण प्रदूषित न हो।

वारंटी : क्योंकि इस दवा का उपयोग हमारे नियन्त्रण से बाहर है इसलिएं इसकी एक पक्षीय गुणवता बनाये रखने के अलावा हमारा कोई भी उतरदायित्व नही है, यादि भंडारण निर्देशानुसार किया जाये।

सावधानी : इस लेबल पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग मना है।

फिप्रोनिल ०.३% जीआर कीटकनाशक

फिप्रोनिल ०.३% जीआर हे फिप्रोनिल ०.३ समाविष्ट असलेले कीटकनाशक भाताच्या पिकावर येणाऱ्या विवध आणि ऊसाचा प्रारंभीचा शेंडा पोखरणारी व मूळ पोखरणाऱ्या किडींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपयुक्त आहे.

वापरासाठी शिफारसीः

फसल	कीड़ो का सामान्य नाम	मात्रा प्रति हैक्टर ए.आई. (सक्रियतत्व) (ग्रा)	फॉम्युलेशन (मि.ली.)	पतला करने के लिए जरूरी पानी (लीटर)	आखिरी छिड़काव तथा कटाई के बीच अंतर (दिनों में)
ऊस	प्रारंभेचा शेंडा पोखरणारी व मूळ पोखरणारी	७५-१००	२५.०-३३.०	-	२७०
तांदूळ	खोड पोखरणारी अळी तपकिरी तुडतुडे, हिरव्या पानांवरील तोडा, पाने गुडाळणाऱ्या अळ्या भातावरील पिजमाशी,होर्ल अळी, पांढऱ्या पाठीचा प्लान्ट तोडा	५०-७५	१६.६७-२५.००	-	३२

वापरावयाची पध्दत आणि उपयोगी साधनेः ग्रॅन्यूल्ससाठी शिफारस केलेल्या मात्रेप्रमाणे गाताने चालणाऱ्या ग्रॅन्यूल ऍप्लीकेटर किंवा यांत्रिक डिस्पोसरद्वारे फवारणी करावी. भातासाठी वापर करताना, तसेच वापर केल्यानंतर शेतामध्ये २-३ दिवसांपर्यत २-३ सें.मी. उंचीचे पाणी असणे आवश्यक आहे.

फिप्रोनील या सक्रीय घटकाची विषक्तताः

अती तीव्र मौखिक एलडी (उंदरावरील) - ९६ मि.ग्रॅ./कि.ग्रॅ.

अती तीव्र त्वचेद्वारे एलडी (उंदरावरील) > २००० मि.ग्रॅ./कि.ग्रॅ.

विषबाधेची लक्षणे : मुख्यत जळजळ,खाज,सुस्ती आणि स्नायुंची थरथर ही लक्षणे संभवतात.जास्त प्रमाणाते विषबाधा झाल्यास आकडी येण्याचा संभव असतो.फिप्रोनील हे रिव्हर्सेबल गाबा रिसंप्टर इनहिबिटर असून संपर्क थाबल्यानंतर ही लक्षणे थांबतात.

प्रथमोपचार : रसायन हुंगल्यास रूणाला ताबडतोब ताज्या हवेत न्या. श्वास धांबल्यास कृत्रिम श्वासोच्छवास द्या. गिळल्यास घशात बोट घालून इलटी करवा. डोळे ऊरपूर पाण्याने स्वच्छ धुवा. त्वचेला लागल्यास व भरपूर पाण्याने पूर्णपणे धुवा.

औषधोपचार : लक्षणानुसार उपचार करा।

वापरणाराने ध्यावयाची दक्षता : वापरताना खाणे तम्बाखू, चघळणे, धूम्रपान इ. टाळावे, हुंगणे, त्वचासंसर्ग होणे टाळावे. उघड्या हातानीं वापर करू नये. वापरताना संरक्षित कपडे उदा. रबरी हातमोजे बूट आणि रबरी झ्रोन च वापर करावा.

साठवण : थंड, अंधाऱ्या, कोरड्या व हवेशीर जागेत साठवावे, लहान मुले, पाळीव प्राणी, काद्यात्र व द्वाला इ. पासून दूर ठेवावे.

वेष्टण व डब्यांची विल्हेवाट : रिकामे डबे, वेष्टण ४ कॉस्टक सोड्याच्या द्रावणात १ तास बुडवुन किटनाशकमुक्त्त करावेत. रिकामे डबे वेहण राहत्या जागेपासून दुर जमीनित १ ते २ मीटक खोल, मोंडीन गाडून टाकावेत. उघड्यावर फेकून देऊ नयेत. उर्वरित औषध व धुवुन काढलेले पाणी सुरक्षित ठिकाणी टाकावे.

सूचना : दवा उत्पादनाचा साठा आमच्या नियंत्रणा पलिकडे असल्यामुळे उत्पानाध्या दर्जात सारखंपणा राखण्या व्यतिरिक्त आन्ही दुसऱ्या कोणत्याही गोष्टीती जवाबदारी घेऊ शकत नाही.

खबरदारीः ह्या लेबल माहतिपत्रकावर निर्देशित पीका व्यतिरिक्त इतर पीकावर वापरु नये.

READ INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE

INDORAMA

PROSPO-GR

FIPRONIL 0.3% G.R.

INSECTICIDE

प्रोस्पो-GR

फिप्रोनिल ०.३% जी. आर.

कीटनाशक

In case of any complaints kindly write to The Manager CRM, Indorama India Private Limited
Ecocentre, EM-4, 12th Floor, Unit No. ECSL-1201, Sector V, Salt Lake, Sech Bhawan, North 24 Parganas, West Bengal – 700091, INDIA
Email: shakirman@in.indorama.com,
Toll Free No. 1800 180 5244

Marketed by:
INDORAMA INDIA PRIVATE LIMITED
Ecocentre, EM-4, 12th Floor, Unit No. ECSL-1201, Sector V, Salt Lake, Sech Bhawan, North 24 Parganas, West Bengal – 700091, INDIA

विपणनकर्ता :
इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
इकोसेंटर, EM-4, 12वीं मंजिल, यूनिट नं० ECSL-1201, सेक्टर–5, सॉल्ट लेक, सच भवन, नार्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल –700091, भारत

Manufactured By
Samarthman Agro Chem Ltd.
(An ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015 Company)
Plot No. 853, Village Parakhandauli, Deva Road, Barabanki- 225123(U.P)

निर्माता:
मै. समर्थमान एग्रो केम लिमिटेड
(An ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015 Company)
प्लाट नं. 853, गांव पाराखंडुली देवा रोड, बाराबंकी - 225123 (उ.प्र.)