Shakti Fertt™

Chlorantraniliprole 0.4% w/w GR
Insecticide

Chlorantraniliprole 0.4% w/w GR is a novel granular insecticide, it is used for the effective control Early Shoot Borer & Top Borer in Sugarcane crop and Yellow Stem Borer & Paddy leaf Folder in Rice crop.

Chemical Composition:

Components Name	% w/w
Chlorantraniliprole a.i	0.40% w/w
Polyacrylic acid	0.40% w/w
Water	0.40% w/w
Dodecyl hydroxypoly (oxy-1,2-ethanediyl) phosphate	0.40% w/w
Calcium lignosulphonate	1.00% w/w
Dye blue	0.05% w/w
Talc powder	8.00% w/w
Sand	Q.S % w/w
Total:	**100.00% w/w**

Dosage:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA AI (gm)	Dosage/HA Formulation (kg)	Dilution in Water	Waiting period between last spray to harvest (days)	Re-entry after each Application (In Hours)
Sugarcane	Early Shoot Borer (Chilo infuscatellus) Top Borer (Scirphophaga excerptalis)	75	18.75	Broadcast	147	-
Rice	Yellow Stem Borer (Scirpophaga incertulas) Paddy leaf Folder (Cnaphalocrosis medinalist)	40	10	Broadcast	53	-

Good Practices relating to insecticide application techniques:

Direction of use: Avoid application during adverse weather conditions. Uniformly broadcast Chlorantraniliprole granules @ 4Kg/acre in Rice and 7.5 kg/acre in Sugarcane. For Sugarcane, application is to be done in furrows at planting or at the base of young emerging shoots along the furrows followed by an irrigation. **Weather Condition(In general):** Avoid application during adverse weather conditions. **Soil & Water (where ever applicable):** light to heavy soil and clean water. **Crop Stage for application:- Application Technique:** Hand operated granular applicator, mechanical disperser or by hand-wearing rubber gloves. **Equipment Type:** Hand operated granular applicator, mechanical disperser or by hand-wearing rubber gloves. **NozzleType:-**

Dosage: Please refer dosage table.

Instruction for Mixing:- Re-entry Period: 24 Hours. **Manner and Time of Application:- Application Timing:** One application at 15 - 35 DAT (Days after transplanting) for Rice In case of sugarcane, single application between planting to 1st irrigation is recommended for Early shoot Borer control while for the Top Borer, application should coincide with appearance of Top Borer moth in the month of May/June. **Frequency:-**

Stages during which pesticides should not be applied on any crop:-

Precautions to be taken to avoid harm to the beneficial insects like honey bees and natural enemies of pests:-

Symptoms of Poisoning: Nasal secretion and mild eye irritant with blurred vision.

First Aid: 1. If ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induce vomiting until and unless desired by attending physician. **2. If inhaled:** Take the person to fresh air and take care of body temperature. If person is not breathing or breathing with difficulty, administer artificial respiration, preferably with mouth to mouth breathing. Consult a physician. **3. In case of skin contact:** Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. **4. In case of eye contact:** Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists, consult eye specialist.

Antidote: No specific antidote, symptomatic and supportive therapy.

Phytotoxity: No phytotoxic at recommended stages.

Storage Conditions: 1. The packages containing the insecticide shall be stored in original container in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles, away from the reach of children and livestock, animal feed or shall be kept in a separate almirah under lock and key. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapor.

Safety Precaution: 1. Do not eat, drink, smoke or chew betel leaves while applying the product. 2. Wear long sleeves shirt, long pants, chemical resistant gloves, googles and covered shoes while handling the product. 3. Wash hands and unprotected parts of the body properly after handling and before eating, drinking or smoking. Remove and wash contaminated clothing separately after use.

Cautionary Statement: 1. Not to be used for any purpose other than specified on label/leaflet. 2. Destroy the container after use as directed on the leaflet. 3. This product is toxic to silkworms. do not rotate mulberry plantations after crops where chlorantraniliprole based formulation was commonly used in foliar or soil applications.

Disposal of used containers, washing from equipment and surplus material: 1. It shall be the duty of manufacturers, formulators of insecticides and operators to dispose packages or surplus materials and washing in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

शक्ति फर्ट

क्लोरऐन्ट्रानिलिप्रोल 0.4% भार/भार जी आर
कीटनाशक

क्लोरऐन्ट्रानिलिप्रोल 0.4% भार/भार जी आर एक नवीन ग्रैन्यूल कीटनाशक है, जिसका उपयोग गन्ने की फसल में तना/कोपल छेदक और शीर्ष छेदक और धान की फसल में पीत तना छेदक और धान का पत्ता मोड़क के प्रभावी नियंत्रण के लिए किया जाता है।

रासायनिक संरचनाः

तत्व	% भा/भा
क्लोरऐन्ट्रानिलिप्रोल	0.40% भा/भा
पोलिएक्रिलिक ऐसिड	0.40% भा/भा
पानी	0.40% भा/भा
डोडिसिल हाइड्रोक्सीपोलि (ओक्सी–1,2–इथेनडाइल) फास्फेट	0.40% भा/भा
केल्शियम इग्नोसल्फोनेट	1.00% भा/भा
डाइ ब्लू	0.05% भा/भा
टाल्क पावडर	8.00% भा/भा
बालू	पर्याप्त मात्रा % भा/भा
योगः	100.00% भा/भा

मात्राः

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स.तत्व (ग्राम)	प्रति हैक्टेयर मात्रा संरचना (किग्रा.)	पानी की मात्रा	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनों में)	पुनः प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
गन्ना	तना/कोपल छेदक (काइलो इनफसकैटेलस) शीर्ष छेदक (स्किर्पोफेगा एक्सरप्टेलिस)	75	18.75	बिखराव	147	–
धान	पीत तना छेदक (सिर्पोफागा इन्सेटुलस) धान का पत्ता मोड़क (नैफालो क्रोसिस मेडिनेलिस)	40	10	बिखराव	53	–

कीटनाशक अनुप्रयोग तकनीकों से संबंधित अच्छे अभ्यासः

उपयोग के लिए निर्देशः मौसम की प्रतिकूल स्थिति के दौरान प्रयोग से बचें। क्लोरेंट्रानिलिप्रोल के दानों को धान में 4 कि.ग्रा./एकड़ और गन्ने में 7.5 किग्रा/एकड़ के हिसाब से एक समान छिड़काव करें गन्ना के लिए, रोपण के समय फरो में या फर के साथ अंकुरण के समय कल्लों की जड़ों के पास मिट्टी में आवेदन करें और इसके बाद सिंचाई करें। **मौसम की स्थितिः** मौसम की प्रतिकूल स्थिति के दौरान प्रयोग न करें। **मिट्टी और पानीः** हल्के से भारी मिट्टी और साफ पानी। **फसल अवस्थाः– आवेदन तकनीकः** हाथ चालित ग्रेनुलर एप्लीकेटर, मैकेनिकल डिस्पर्सर द्वारा या हाथ में रबर के दस्ताने पहनकर। **उपकरण प्रकारः** हाथ से संचालित दानेदार ऐप्लिकेटर, मैकेनिकल डिस्पेंसर या हाथ से पहनने वाले रबर के दस्ताने। **नोजल प्रकारः–**

खुराकः तालिका देखें।

मिश्रण के लिए निर्देशः– पुनः प्रवेश अवधिः 24 घंटे। **आवेदन का रीति और समयः– आवेदन का समयः** धान के लिए: रोपाई 15–35 दिन बाद एक आवेदन। गन्ने के लिए: तना छेदक पर नियंत्रण के लिए पौध लगाने से पहली सिंचाई के बीच, जबकि शीर्ष छेदक के लिए, मई/जून में शीर्ष छेदक कीट के दिखाई देने पर एक आवेदन किया जाना चाहिएं। **अधिक से अधिक अंक सहित आवृतिः –**

चरण जिसके दौरान किसी भी फसल पर कीटनाशक नही लगाया जाना चाहिएः–

शहद की मक्खियों और कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं जैसे लाभकारी कीड़ों से नुकसान से बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानियाँः–

विष के लक्षणः नाक बहना और आँख की जलन के साथ नजर का धुंधलापन।

प्राथमिक उपचारः 1. निगल लिए जान परः यदि व्यक्ति होश में और सजग है, तो कुल्ला करांए और या 2 गिलास पानी पीने को दें। बेहोश व्यक्ति को मुँह से कुछ भी न दें। डॉक्टर को बुलाएं। डॉक्टर के कहे बिना उल्टी न कराए। **2. साँस ले लेने परः** व्यक्ति को खुली हवा में ले जाएं और शरीर के तापमान का ध्यान रखें। यदि व्यक्ति साँस न ले रहा हो या साँस लेने में परेशानी हो, तो मुँह से कृत्रिम श्वास दें। डॉक्टर की सलाह लें। **3. त्वचा से संपर्क होने परः** बालों और नाखुनों की जड़ों सहित शरीर के प्रभावित हिस्से को साबुन और काफी सारे पानी से अच्छी तरह धोएं। यदि दर्द, लालिमा या खुजली जारी रहे, तो डॉक्टर की सलाह लें सभी दूषित कपड़ों को अलग रखें और प्रयोग करने से पहले साबुन और काफी सारे पानी से अच्छे तरह धोएं। **4. आँख से संपर्क होने परः** कम से 15 मिनट तक काफी सारे पानी से छींटे मारें। यदि दर्द, लालिमा, खुजली या फोटोफोबिया जारी रहे, तो आँखों के डॉक्टर की सलाह लें।

विषनाशकः कोई विशिष्ट विषहर औषध नही है, लाक्षणिक उपचार करें। रोगसूचक और सहायक चिकित्सा करें। **पादप आविषालुताः** अनुशंसित चरणों में कोई फाइटोटॉक्सिक नही।

संग्रहण की शर्तें: 1. कीटनाशक युक्त पैकेज को मूल कंटेनर में अलग कमरे में या परिसर में अन्य वस्तुएं रखे जाने वाले कमरे या परिसर से दूर, बच्चों और पशुओं की पहुंच से दूर, पशुओं के चारे से दूर अथवा अलमारी में ताला और चाबी लगाकर रखना चाहिए 2. कीटनाशक से संग्रहण के लिए बने कमरे या परिसर अच्छी तरह निर्मित, शुष्क, अच्छी रोशनी वाले, और हवादार और वाष्प के साथ संदूषण से बचने के लिए पर्याप्त आयाम वाले होने चाहिए।

सुरक्षा के लिए सावधानियाँः 1. उत्पाद का प्रयोग करते समय न कुछ खाएं, न पियें, न धूम्रपान करें न ही पान चबाएं। 2. प्रोडक्ट का प्रयोग करते समय पूरे बांह की शर्ट, लंबी पैंट, रासायनिक प्रतिरोध दस्ताने, मास्क, चश्मा और ढके हुए जूते पहनें 3. हाथों और शरीर के खुले हिस्सों को अच्छी तरह धोएं, खाने और पीने या धूम्रपान करने से पहले। प्रयोग के बाद दूषित कपड़ों को उतारकर धोएं।

सावधानिया कथनः 1. लेबल/पुस्तिका पर निर्दिष्ट के अलावा अन्य किसी प्रयोजन से प्रयोग न किया जाए। 2. पुस्तिका पर निर्देश के अनुसार प्रयोग के बाद डिब्बे को नष्ट कर दें। 3. यह प्रोडक्ट रेशम के कीड़ों के लिए विषक्त है। उन फसलों के बाद मलबरी के बागानों को न लगाये जहां आमतौर पर क्लोरऐन्ट्रानिलिप्रोल आधारित सूत्रीकरण का उपयोग पत्ते या मिट्टी में किया जाता हो।

कीटनाशक के प्रयोग किये गए डिब्बों, बचे हुही कीटनाशकों तथा पात्रों के धोवन का निपटाराः 1. यह कीटनाशक निर्माता तथा उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि वह डिब्बों, पैकेजस या बची हुई कीटनाशक तथा धोवन का निपटारा सुरक्षित ढंग से करें जिससे वातावरण या पानी प्रदूषित न हो। 2. उपयोग किए गए डिब्बों/पैकेजस को बाहर न फेंके जिससे उनका दुबारा प्रयोग न हो। 3. उपयोग किए गए डिब्बो/पैकेजस तोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ दें।

ਸ਼ਕਤੀ ਫਰਟ

ਕਲੋਰਐਂਟ੍ਰਾਨਿਲਿਪ੍ਰੋਲ 0.4% ਭਾਰ/ਭਾਰ ਜੀ.ਆਰ.
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ

ਕਲੋਰਐਂਟ੍ਰਨਿਲਿਪ੍ਰੋਲ 0.4% ਭਾਰ/ਭਾਰ ਜੀ ਆਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗ੍ਰੈਨਯੂਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਤਨਾ/ਕਲੀ ਛੇਦਕ ਅਤੇ ਸਿਰਾ ਛੇਦਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਪੀਲੇ ਤਨਾ ਛੇਦਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪੱਤਾ ਮੋੜਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੰਰਚਨਾ:

ਤੱਤ	% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਕਲੋਰਐਂਟ੍ਰਨਿਲਿਪ੍ਰੋਲ ਸਰਗਰਮ ਤੱਤ	0.40% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਪੌਲਿਅਕ੍ਰਿਲਿਕ ਐਸਿਡ	0.40% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਪਾਣੀ	0.40% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਡੋਡਿਸਾਇਲ ਹਾਇਡ੍ਰੋਕਸੀਪੋਲੀ (ਔਕਸੀ-1,2-ਇਥੇਨਡਾਇਲ) ਫਾਸਫੇਟ	0.40% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਕੈਲਸ਼ਿਅਮ ਲਿਗਨੋਸਲਫੋਨੇਟ	1.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਡਾਇ ਬਲੂ	0.05% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਟਾਲਕ ਪਾਊਡਰ	8.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਰੇਤ	ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ % ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਕੁਲ:	100.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ

ਮਾਤਰਾ:

ਫਸਲ	ਕੀਟ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਨਾਂਅ	ਮਾਤਰਾ/ਹੈਕਟੇਅਰ ਸ.ਤ (ਗ੍ਰਾ.)	ਮਾਤਰਾ/ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੰਰਚਨਾ (ਕਿਗ੍ਰਾ.)	ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ	ਅੰਤਮ ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰਾਲ (ਦਿਨ)	ਮੁੜ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹਰੇਕ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ)
ਗੰਨਾ	ਤਨਾ/ਕਲੀ ਛੇਦਕ (ਕਾਇਲੋ ਇਨਫਸਕੈਟੇਲਸ) ਸਿਰਾ ਛੇਦਕ (ਸਕਿਰਪੋਫੇਗਾ ਐਕਸਰਪਟੇਲਿਸ)	75	18.75	ਪਸਾਰ	147	-
ਝੋਨਾ	ਪੀਲਾ ਤਨਾ ਛੇਦਕ (ਸਕਰਪਾਫਾਗਾ ਇੰਸਿਟੁਲਸ) ਝੋਨੇ ਦਾ ਪੱਤਾ ਮੋੜਕ (ਨੈਫਾਲਾ ਕ੍ਰੋਸਿਸ ਮੇਡਿਨੇਲਿਸ)	40	10	ਪਸਾਰ	53	-

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲ:

ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਮੌਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕਲੋਰਐਂਟ੍ਰਨਿਲਿਪ੍ਰੋਲ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਗ੍ਰਾ/ਏਕੜ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਵਿੱਚ 7.5 ਕਿਗ੍ਰਾ/ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ। ਗੰਨੇ ਲਈ, ਬੁਆਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਤਾਰ ਨਾਲ ਅੰਕੁਰਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਕਰੋ। **ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ:** ਮੌਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। **ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ:** ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ। **ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਫਸਲ ਅਵਸਥਾ:- ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਤਕਨੀਕ:** ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੈਨੁਲਰ ਐਪਲੀਕੇਟਰ, ਮੈਕੇਨਿਕਲ ਡਿਸਪਰਸਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਬੜ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾ ਕੇ। **ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਕਿਸਮ:** ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੈਨੁਲਰ ਐਪਲੀਕੇਟਰ, ਮੈਕੇਨਿਕਲ ਡਿਸਪਰਸਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਬੜ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾ ਕੇ। **ਨੋਜ਼ਲ ਦੀ ਕਿਸਮ:-**

ਖੁਰਾਕ: ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤਾਲਿਕਾ ਅਨੁਸਾਰ।

ਮਿਸ਼ਰਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼:- ਮੁੜ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ: 24 ਘੰਟੇ। **ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾ:- ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ:** ਝੋਨੇ ਲਈ: ਰੁਪਾਈ ਦੇ 15-35 ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਗੰਨੇ ਲਈ: ਤਨਾ ਛੇਦਕ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਪੌਦ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦਰਮਿਆਨ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਾ ਛੇਦਕ ਲਈ, ਮਈ/ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਾ ਛੇਦਕ ਕੀਟ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। **ਆਵਰਤਿਤੀ:-**

ਪੜਾਅ ਜਿਹਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ:-

ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੀਵਾਂ ਵਰਗੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ:-

ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ: ਨੱਕ ਵਹਿਣਾ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਧੁੰਦਲਾਪਣ।

ਮੁਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ: 1. ਨਿਗਲਣ ਤੇ: ਬਿਨਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਬੇਹੋਸ਼ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਰੋਗੀ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਚੌਕੰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 1-2 ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ। ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। **2. ਸੁੰਘਣਾ:** ਸੁੰਘਣ ਤੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਸਨੂੰ ਗਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਸਾਹ ਨਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹ ਕ੍ਰਿਆ ਕਰ ਔਕਸੀਜਨ ਦਿਓ। ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲਓ। **3. ਤੁਚਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ:** ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨੌਂਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ। ਦਰਦ, ਲਾਲੀ, ਜਾਂ ਜਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਪੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। **4. ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ:** ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਘੱਟ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਧੋਵੋ। ਜੇਕਰ ਦਰਦ, ਜਲਨ ਜਾਂ ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਫੋਟੋਫੋਬੀਆ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ।

ਜ਼ਹਿਰਨਾਸ਼ਕ: ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਹਿਰਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਲੱਛਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਪੌਦਾਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ: ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੌਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ: 1. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਪੈਕਜ ਨੂੰ ਮੂਲ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੁੱਕੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਥਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਭਾਫ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਸਤੇਮਾਲਕਰਤਾ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ: 1. ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਖਾਓ, ਪੀਓ ਨਾ, ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਹੀ ਪਾਨ ਚਬਾਓ। 2. ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲੰਮੀ ਬਾਂਹ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਟ, ਲੰਬੀ ਪੈਂਟ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਸਤਾਨੇ, ਮਾਸਕ, ਐਨਕ ਅਤੇ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਜੁੱਤੇ ਪਹਿਨੋ। 3. ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ, ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਪੜੇ ਲਾਹ ਕੇ ਧੋ ਲਓ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ: 1. ਲੇਬਲ/ਲੀਫਲੇਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। 2. ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। 3. ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲੋਰਐਂਟ੍ਰਨਿਲਿਪ੍ਰੋਲ ਅਧਾਰਤ ਸੂਤਰੀਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੱਤੇ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਬਰੀ ਦੇ ਬਾਗਾਨ ਨਾ ਲਗਾਓ।

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੱਬਿਆਂ, ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਧੋਵਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ: 1. ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਡੱਬਿਆਂ/ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਏ। 2. ਉਪਯੋਗ ਕਿਤੇ ਗਏ ਡੱਬੇ/ਪੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸੁੱਟੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪਯੋਗ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 3. ਪੈਕੇਟਾਂ/ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮੋੜ ਕੇ ਅਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿਓ।

شکتی فرٹ

کلورانٹرا نیلی پرول 0.4% ڈبلو/ڈبلو جی آر
دونکش

کلورانٹرا نیلی پرول 0.4% ڈبلو/ڈبلو جی آر ایک نیا دانے دار دونکش ہے جس کا استعمال گنے کی فصل میں کونپل تنا اور بالائی حصے میں سوراخ کرنے والے کیڑوں اور دھان کی فصل میں تنا چھیدنے والے پتے لپیٹنے والے کیڑوں کو کنٹرول کرتا ہے۔

کیمیا ئی اجزائے ترکیبی:

مواد	ڈبلو/ڈبلو %
کلورانٹرا نیلی پرول فعال مادہ	0.40% ڈبلو/ڈبلو
پولی ایکریلیک ایسڈ	0.40% ڈبلو/ڈبلو
پانی	0.40% ڈبلو/ڈبلو
ڈوڈِسل ہائیڈروکسی پولی (اوکسی-1,2-ایتھین ڈائل) فاسفیٹ	0.40% ڈبلو/ڈبلو
کیلشیم لگنو سلفونیٹ	1.00% ڈبلو/ڈبلو
ڈائی بلو	0.05% ڈبلو/ڈبلو
ٹالک پاؤڈر	8.00% ڈبلو/ڈبلو
بالو	QS % ڈبلو/ڈبلو
کُل:	100.00% ڈبلو/ڈبلو

خوراک:

فصل	کیڑوں کے عام نام	خوراک/ہیکٹر اے آئی (gm.)	خوراک/ہیکٹر محلول (kg)	پانی میں گھول	انتظار کی مدت آخری چھڑکاؤ سے کٹائی تک (دنوں میں)	دوسرے داخلے کی مدت ہر ایک چھڑکاؤ کے بعد (گھنٹوں میں)
گنّا	تنا کونپل میں سوراخ کرنے والے (کائلو انفس کیٹلس) بالائی حصے میں سوراخ کرنے والے (سرپوفیگا اسکرپٹیلس)	75	18.75	چھڑکاؤ	147	-
دھان	تنا چھیدنے والے پیلے کیڑے (سرپوفیگا انسرٹیولس) دھان پتی موڑنے والے کیڑے (نیفالو کروسِس میڈی نیلِسٹ)	40	10	چھڑکاؤ	53	-

دونکش کے استعمال کے بہتر طریقے:

ترکیب استعمال: خراب موسم میں اسے استعمال نہ کریں - یکساں چھڑکاؤ کریں - کلورانٹرا نیلی پرول دانے کا دھان میں 4 کلوفی ایکڑ اور گنے کی فصل میں 7.5 کلو فی ایکڑ کے حساب سے استعمال کریں - گنے کی فصل میں روپائی کے وقت فوروس یا روئیدگی کے وقت فورو کے ساتھ جڑوں کی مٹی میں ڈالیں اور پھر سینچائی کریں۔ **موسمی کیفیت (عام حالات میں):** خراب موسم میں اس کا استعمال نہ کریں۔ **مٹی اور پانی (جو بھی قابل استعمال ہو):** ہلکی سے بھاری مٹی اور صاف پانی۔ **اسپرے کے وقت فصل کی کیفیت:- ترکیب استعمال:** ہاتھ سے چلنے والے دانہ ڈالنے والے آلات، دانہ ڈالنے والے میکانیکی آلات - ہاتھ میں ربر کے دستانے پہن کے۔ **اسپرے کے آلات:** ہاتھ سے چلنے والے دانہ ڈالنے والے آلات، دانہ ڈالنے والے میکانیکی آلات - ہاتھ میں ربر کے دستانے پہن کے۔ **نوزل والا:-**

خوراک: مذکورہ بالا فصلوں کے لئے سفارش کردہ چارٹ کے مطابق۔

گھول بنانے کا طریقہ:- دوبارہ داخلے کی مدت: 24 گھنٹے۔ **استعمال کا وقت:- اسپرے کا غلط وقت:** دھان کی فصل میں ایک بار استعمال - روپائی کے 35-15 دن بعد۔ گنے کی فصل میں تنا چھیدنے والے کیڑوں کے کنٹرول کے لئے پودا لگانے اور پہلی سینچائی کے درمیان - جبکہ بالائی کیڑوں کے کنٹرول کے لئے مئی/ جون میں جیسے ہی کیڑے نظر آئیں فورا چھڑکاؤ کریں۔ **وقفہ:-**

کس وقت اس دونکش کا استعمال کسی بھی فصل پر نہیں کرنا چاہئے:-

نفع بخش کیڑوں جیسے شہد کی مکھیوں اور کیڑوں کے دشمن حشرات کو گزند نہ پہنچائیں:-

زہر کی علامات: ناک چلنا اور آنکھوں میں سوزش اور دھندلاپن۔

ابتدائی طبی امداد: 1. نگل لینا: جب تک ڈاکٹر نہ کہے اسے زبردستی قئی نہ کرائیں۔ بے ہوش شخص کو کچھ بھی منہ سے نہ کھلائیں۔ منہ کو پانی سے صاف کریں۔ اگر مریض ہوش و حواس میں ہے تو اسے ایک دو گلاس پینے کا پانی دیں۔ ڈاکٹر سے فوری طور پر رجوع کریں۔ **2. سانس کے ذریعہ اندر داخل ہونا:** مریض کو تازہ ہوا میں لے جائیں اور اسے گرم اور پرسکون رکھیں۔ اگر سانس رک رہی ہو یا سانس لینے میں دقت ہو رہی ہو تو منہ کے ذریعہ تنفس دیں یا آکسیجن دیں۔ ڈاکٹر سے فوری طور پر رجوع کریں۔ **3. اگر جلد پر لگ جائے:** جسم کے آلودہ حصے کو یہاں تک کہ بالوں اور ناخنوں کے اندرونی حصوں تک کو صابن اور پانی سے اچھی طرح دھلیں۔ اگر درد، سرخی اور سوزش برقرار رہتی ہے تو کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ تمام آلودہ کپڑوں کو الگ کر کے صابن اور پانی سے اچھی طرح دھلیں اور پھر پہنیں۔ **4. اگر آنکھوں میں لگ جائے:** آنکھوں کو صاف پانی سے کم از کم 15 منٹ تک اچھی طرح دھلیں۔ اگر درد، سرخی اور روشنی سے گھبراہٹ برقرار رہتی ہے تو کسی آنکھوں کے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔

تریاق: اس کا کوئی خاص علاج نہیں ہے۔ علامات کے مطابق علاج کریں۔

پودوں کی سمیت: اگر اوپر بتائے گئے طریقوں سے استعمال کیا گیا تو اس میں کوئی -

اسٹوریج کے لئے ہدایات: 1- اس دوا کش کے مواد کو ان کے اصل ڈبوں میں الگ کمرے یا مکان میں، استعمال میں آنے والے دیگر سامانوں سے الگ، بچوں اور جانوروں اوران کے چاروں سے دور یا پھر الگ چابی تالے کے ساتھ رکھیں۔ 2- دونکش کو رکھا جانے والا کمرہ یا عمارت کشادہ اور روشن دار و الاہونا چاہئے تاکہ اس کی بھاپ کمرے سے نکل جائے۔

احتیاطی اقدامات: 1- اس کے استعمال کے وقت پان، بیڑی سگریٹ پینے اور تمباکو کھانے سے بچیں -2- اسے استعمال کرتے وقت لمبی آستین کی قمیص اور لمبا پینٹ، کیمیکل کی روک تھام کرنے والا دستانہ، چشمہ اور پورے پیر کو ڈھانپنے والا جوتا پہنیں - 3- اس کے استعمال کے بعد ہاتھ اور جسم کے کھلے دیگر اعضاء کو کھانے پینے اور سگریٹ پینے سے قبل اچھی طرح دھلیں اور پھر آلودہ کپڑوں کو بھی اچھی طرح دھلیں۔

حفاظتی اقدامات: 1- صرف پرچی اور لیبل میں مذکور فصلوں اور کیڑوں کے لئے ہی اسے استعمال کیا جائے۔ 2- استعمال کے بعد پرچی میں مذکور ہدایت کے مطابق ڈبوں کو ضائع کر دیا جائے۔ 3- یہ پروڈکٹ ریشم کے کیڑوں کے لئے زہریلا ہے۔ ان فصلوں کے بعد ان اراضی میں شہتوری کے باغات نہ لگائیں جہاں کلورانٹرا نیلی پرول کا استعمال پودوں کی پتیوں پر یا مٹی میں کیا گیا ہو۔

استعمال شدہ ڈبوں کو ضائع کرنا، آلات کی دھلائی اور فاضل مواد: 1- یہ دونکش بنانے والوں اور استعمال کرنے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خالی ڈبوں اور زائد مواد کو اس طرح ضائع کریں یا دھلیں کہ اس سے ماحولیات اور پانی آلودہ نہ ہو۔ 2- ڈبوں کو توڑ کے آبادی سے دور دفن کریں۔ 3- خالی ڈبوں کے دوبارہ استعمال سے بچنے کے لئے انہیں باہر نہ ڈال دیں۔

શક્તિ ફર્ટ

ક્લોરેન્ટ્રાનિલિપ્રોલ 0.4% ભાર/ભાર જી.આર.
જંતુનાશક

ક્લોરેન્ટ્રાનિલિપ્રોલ 0.4% ભાર/ભાર જી.આર. એ નવું દાણાદાર જંતુનાશક છે. તેનો ઉપયોગ શેરડીના પાકમાં થતા અર્લી શૂટ બોરર અને ટોપ બોરર તેમજ ડાંગરના પાકમાં થતા પેળો સ્ટેમ બોરર અને પેડી લીફ ફોલ્ડર પર અસરકારક રીતે અંકુશ માટે કરવામાં આવે છે.

રાસાયણિક સંયોજન:

તત્વ	% ભાર/ભાર
ક્લોરેન્ટ્રાનિલિપ્રોલ સ.ત.	0.40% ભાર/ભાર
પોલીએક્રિલિક એસિડ	0.40% ભાર/ભાર
પાણી	0.40% ભાર/ભાર
ડોડિસાઈલ હાઈડ્રોક્સિપોલી (ઓક્સિ-1,2-ઈથેનડાયલ) ફોસ્ફેટ	0.40% ભાર/ભાર
કેલ્શિયમ લિગ્નોસલ્ફોનેટ	1.00% ભાર/ભાર
ડાઈ બ્લુ	0.05% ભાર/ભાર
ટેલ્ક પાવડર	8.00% ભાર/ભાર
રેતી	જરૂરી માત્રા % ભાર/ભાર
કુલ:	100.00% ભાર/ભાર

માત્રા:

પાક	જીવાતનું સામાન્ય નામ	પ્રતિ હેક્ટર માત્રા સ.ત. (ગ્રામ)	પ્રતિ હેક્ટર માત્રા સંરચના (કિ.ગ્રા.)	પાણીની માત્રા	છેલ્લો છંટકાવ તથા પાક કાપવા વચ્ચેનો અંતર (દિવસ)	દરેક ઉપયોગ પછી ફરી પ્રવેશની મુદત (કલાકમાં)
શેરડી	અર્લી શૂટ બોરર (કાઈલો ઈન્ફસ્કેટેલસ) ટોપ બોરર (સિર્પોફેગા એક્સપર્ટાલિસ)	75	18.75	વિખેરો	147	-
ડાંગર	પેળો સ્ટેમ બોરર (સિર્પોફેગા ઈન્સર્ટુલસ) પેડી લીફ ફોલ્ડર (નેફાલોક્રોસિસ મેડિનાલિસ્ટ)	40	10	વિખેરો	53	-

જંતુનાશકના ઉપયોગની ટેકનિક અંગે સારી પ્રથા:

ઉપયોગ માટેના નિર્દેશ: પ્રતિકૂળ હવામાનની સ્થિતિ દરમિયાન ઉપયોગ કરશો નહીં. ક્લોરેન્ટ્રાનિલિપ્રોલના દાણામાં ડાંગરના પાકમાં એકર દીઠ 4 કિ.ગ્રા. અને શેરડીના પાકમાં એકર દીઠ 7.5 કિ.ગ્રા.ના દરે એક સમાન રીતે પ્રસરાવો. શેરડીના પાક માટે રોપણીના સમયે ચાસમાં અથવા ચાસના અંકુરણ સમયે મૂળની પાસે માટીમાં નાખો. તે પછી તેમાં પાણી રેડો. **હવામાનની સ્થિતિ (સામાન્ય રીતે):** પ્રતિકૂળ હવામાનની સ્થિતિ દરમિયાન ઉપયોગ કરશો નહીં. **જમીન અને પાણી (જ્યાં લાગુ પડતું હોય ત્યાં):** હલકીથી માંડીને ભારે માટી અને સાફ પાણી. **ઉપયોગ માટે પાકની અવસ્થા:- ઉપયોગની ટેકનિક:** હાથથી ચાલતું ગ્રેન્યુલ ઓપરેટર, મશીનથી ચાલતું ડિસ્પેન્સર અથવા હાથમાં રબરનાં મોજાં પહેરીને. **ઉપકરણનો પ્રકાર:** હાથથી ચાલતું ગ્રેન્યુલ ઓપરેટર, મશીનથી ચાલતું ડિસ્પેન્સર અથવા હાથમાં રબરનાં મોજાં પહેરીને. **નોઝલનો પ્રકાર:-**

માત્રા: ભલામણ પત્રકમાં કર્યા જણાવ્યા અનુસાર.

મિશ્રણ માટેના નિર્દેશ:- પુન: પ્રવેશનો સમય: 24 કલાક. **ઉપયોગની રીત અને તેનો સમય:- ઉપયોગનો સમય:** ડાંગર માટે: રોપણીના 15 થી 35 દિવસ પછી એકવાર છંટકાવ. શેરડી માટે: અર્લી શૂટ બોરર પર અંકુશ માટે છોડની રોપણીથી પહેલી વાર સિંચાઈ સુધીમાં એકવાર છંટકાવ. ટોપ બોરર માટે મે/જૂન મહિનામાં રોગ દેખાય ત્યારે એક છંટકાવની ભલામણ કરવામાં આવે છે. **આવૃત્તિ:-**

કોઈપણ પાક પર કયા તબક્કે જંતુનાશકનો છંટકાવ ન કરવો જોઈએ:-

મધમાખીઓ અને જીવાતના કુદરતી દુશ્મન જેવા ઉપયોગી જીવોને નુકસાન થતું અટકાવવા માટે રાખવાની સાવચેતીઓ:-

ઝેરનાં લક્ષણો: નાક વહેવું, આંખોમાં હલકી બળતરા સાથે ધૂંધળું દેખાવું.

પ્રાથમિક સારવાર: 1. ગળવું: ડોક્ટર દ્વારા કહેવામાં ન આવે ત્યાં સુધી ઉલટી કરાવવી નહીં. બેભાન વ્યક્તિને કાંઈ ન આપો પાણીથી મોં સાફ કરો, જો દર્દી સભાન હોય તો પીવા માટે 1-2 ગ્લાસ પાણી આપો. તરત જ તબીબી સારવાર મેળવો. **2. શ્વાસમાં અંદર જવું:** ભોગ બનનારને તાજી હવામાં લઈ જાવ અને તેને ગરમ અને શાંત સ્થિતિમાં રાખો. જો શ્વાસ લેવાતો ન હોય અથવા શ્વસન કરવું મુશ્કેલ હોય તો મોઢા દ્વારા શ્વાસોચ્છવાસ આપવો અથવા ઓક્સિજન આપો. તરત જ તબીબી સારવાર મેળવો. **3. ચામડીને સ્પર્શ થયો હોય ત્યારે:** માથાના વાળ અને આંગળીઓના નખની નીચે સહિત શરીરના પ્રદૂષિત ભાગોને સાબુ વડે બરાબર ધોઈ નાખો. જો દુખાવો, લાલ ચકામાં કે બળતરા ચાલુ રહે તો ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો. પ્રદૂષિત કપડાંને અલગ કરી દો અને ફરી ઉપયોગ પહેલાં તેને સાબુ તથા ભરપૂર પાણીથી અલગ-અલગ ધુઓ. **4. આંખોને સ્પર્શ થયો હોય ત્યારે:** 15 મિનિટ સુધી આંખોને હળવેથી ધુઓ. જો દુખાવો, બળતરા અને લાલ ચકામાં કે ફોટોફોબિયા ચાલુ રહે તો આંખના ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો.

રોગના મારણ અંગેનું નિવેદન: ઝેરનું કોઈ ખાસ મારણ નથી. લક્ષણો મુજબ સારવાર કરો. રૂગ્ણસૂચક અને સહાયક સારવાર કરો.

છોડની વિષયુક્તતા: જરૂરી માત્રામાં ઉપયોગ કરવાથી છોડને ઝેર ચઢતું નથી.

સંગ્રહની શરતો: 1. જંતુનાશકના પેકેટને તેના મૂળ કન્ટેનરમાં મૂકીને અલગ ઓરડામાં અથવા અન્ય વસ્તુઓના સંગ્રહ માટે વપરાતા ઓરડા કે સંકુલથી દૂર રહે તેમ તેને પશુ આહારથી દૂર કબાટમાં તાળાચાવીમાં રાખવું જોઈએ. 2. જે રૂમ અથવા કબાટમાં આ જંતુનાશકનો સંગ્રહ કરવાનો હોય તે સારી રીતે બનેલો, સૂકો, હવા-ઉજાસવાળો અને પ્રયાપ્ત આકારનો હોવો જોઈએ જેથી જંતુનાશકની વરાળથી વાતાવરણ પ્રદૂષિત થવાનું જોખમ ન રહે.

સુરક્ષા અંગેની ચેતવણી: 1. આ ઉત્પાદનના ઉપયોગ દરમિયાન કશું પણ ખાવું, પીવું, ચાવવું કે ધૂમ્રપાન કરવું નહીં. 2. આ ઉત્પાદનના ઉપયોગ વખતે લાંબી બાંયનું ખમીસ, લાંબો પેન્ટ, રસાયણ વિરોધી મોજાં, માસ્ક, ચશ્માં અને પગ ઢાંકતાં પગરખાં પહેરો. 3. આ ઉત્પાદનના ઉપયોગ પછી અને કશું પણ ખાતાં, પીતાં કે ધૂમ્રપાન કરતાં પહેલાં હાથ અને શરીરના બાહ્ય ભાગોને બરાબર સાફ કરો. પ્રદૂષિત કપડાંને તુરંત ઉતારીને ધોઈ નાખો.

ચેતવણીસૂચક નિવેદન: 1. આ સાથેના લીફલેટમાં જણાવ્યા સિવાયના પાક અને જંતુઓ પર આ જંતુનાશકનો ઉપયોગ કરશો નહીં. 2. જંતુનાશકના ઉપયોગ પછી કન્ટેનરનો નિકાલ લીફલેટમાં જણાવ્યા મુજબ કરો. 3. આ ઉત્પાદન રેશમના કીડાઓ માટે ઝેરી છે. સામાન્ય રીતે ક્લોરેન્ટ્રાનિલિપ્રોલ આધારિત સંયોજનનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય અથવા તેને માટીમાં ભેળવવામાં આવતું હોય, ત્યાં પાક લીધા પછી મલબારીના છોડ રોપશો નહીં.

ઉપયોગમાં લેવાયેલ કંટેનર, ઉપકરણમાંના ધોવાણ અને બચેલી સામગ્રીનો નિકાલ: 1. આ જંતુનાશકના નિર્માતા અને વપરાશકારની એ ફરજ છે કે ખાલી ડબ્બાઓ/ વધેલ જંતુનાશકના છંટકાવનાં સાધનોના ધોવાણવાળા પાણીનો સુરક્ષિત નિકાલ કરે કે જેથી વાતાવરણ પ્રદૂષિત ન થાય. 2. ઉપયોગ કરેલા ખાલી ડબ્બા/પેકેટોનો ફરીવાર ઉપયોગ ન થાય એ માટે તેને બહાર ન ફેંકશો. 3. ઉપયોગ પછી ખાલી ડબ્બાને તોડીને રહેવાની જગ્યાથી દૂર ઊંડો ખાડો કરીને તેમાં દાટી દો.

शक्ति फर्ट

क्लोरएंट्रानिलीप्रोल 0.4% भार/भार जी.आर.
कीटकनाशक

क्लोरएंट्रानिलीप्रोल 0.4% भार/भार जी आर हे एक नवीन दाणेदार कीटकनाशक आहे, ज्याचा वापर ऊसाच्या पिकावरील अर्ली शूट बोरर आणि टॉप बोरर आणि भाताच्या पिकावरील यलो स्टेम बोरर आणि पॅडी लीफ फोल्डरच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी केला जातो.

रासायनिक रचनाः

घटक	% भार/भार
क्लोरएंट्रानिलीप्रोल स.त.	0.40% भार/भार
पॉलिएक्रीलिक एसिड	0.40% भार/भार
पाणी	0.40% भार/भार
डोडेसिल हायड्रोक्सिपोली (ऑक्सि–1,2–इथेनडाइल) फॉस्फेट	0.40% भार/भार
कॅल्शियम लिग्नोसल्फोनेट	1.00% भार/भार
डाय ब्लू	0.05% भार/भार
टॅल्क पावडर	8.00% भार/भार
वाळू	पुरेशी मात्रा % भार/भार
एकूणः	100.00% भार/भार

प्रमाणः

पीक	कीटकांचे सामान्य नाव	प्रति हेक्टर मात्रा सं.तत्व (ग्रॅ.)	प्रति हेक्टर मात्रा संरचना (कि.ग्रॅ.)	पाण्याचे प्रमाण	अंतिम फवारणी आणि पीक कापण्याच्या काळात अंतर (दिवसात)	प्रत्येक वापरानंतर पुनर्प्रवेश (तासांमध्ये)
ऊस	अर्ली शूट बोरर (काइलो इन्फसकॅटेलस) टॉप बोरर (स्करफोफेगा एक्सारप्टालिस)	75	18.75	भुरकावणे	147	–
भात	यलो स्टेम बोरर (स्करफोफेगा इन्सरटुलस) पॅडी लीफ फोल्डर (निफालाक्रोसिस मेडिनालिस्ट)	40	10	भुरकावणे	53	–

कीटनाशक वापरण्याच्या तंत्रासंबंधी चांगल्या पद्धतीः

वापरण्यासाठी निर्देशः प्रतिकूल हवामान परिस्थिती असताना वापरू नये. भातासाठी 4 कि./एकर आणि ऊसासाठी 7.5 कि./एकर या प्रमाणात क्लोरएंट्रानिलीप्रोलचे दाणे सगळीकडे एकसमान भुरकावे. ऊसासाठी, रोपे लावताना आळ्यात किंवा नवीन कोंब फुटताना आळ्याबरोबरच कोंबाच्या मुळाशी टाकावे नंतर सिंचन करावे. **हवामान परिस्थिती (सामान्यत)ः** प्रतिकूल हवामान परिस्थिती असताना वापरू नये. **माती आणि पाणी (जिथे वापरायचे आहे)ः** हल्की ते जड माती आणि स्वच्छ पाणी. **वापरण्यासाठी पिकाची स्थितीः– वापरण्याची पद्धतः** हाताने चालणारे ग्रॅन्यूअल ऑपरेटर, मेकॅनिकल डिस्पर्सर किंवा हातात रबरी हातमोजे घालून. **उपकरणाचे प्रकारः** हाताने चालणारे ग्रॅन्यूअल ऑपरेटर, मेकॅनिकल डिस्पर्सर किंवा हातात रबरी हातमोजे घालून. **नोझल प्रकारः–**

प्रमाणः कृपया सूचना तक्ता बघा.

मिश्रणासाठी निर्देशः– पुनर्प्रवेश अवधीः 24 तास. **वापरण्याची वेळ आणि पद्धतः– वापरण्याची वेळः** भातासाठी रोपे लावल्यानंतर 15–35 दिवसांनी एकदा वापरावे आणि ऊसामधील अर्ली शूट बोररच्या नियंत्रणासाठी रोप लावल्यापासून पहिल्या सिंचनादरम्यान एकदा वापरावे तर टॉप बोररसाठी मे/जून महिन्यात टॉप बोरर कीटक दिसताच वापरावे. **पुनरावृत्तीः–**

स्थिती, ज्यादरम्यान कोणत्याही पिकावर कीटनाशक वापरू नयेः–

मधमाशांसारखे लाभदायक कीटक आणि कीटकांच्या नैसर्गिक शत्रूंना हानी पोचू नये म्हणून घ्यायची काळजीः–

विषबाधेची लक्षणेः नाक गळणे आणि अंधुक दिसण्यासह डोळ्यांची थोडी आग होणे.

प्राथमिक चिकित्साः 1. गिळणेः डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय उल्टी करवू नका. बेशुद्ध रुग्णाला काही देऊ नका. तोंड पाण्याने धुवा, जर रुग्ण शुद्धीत आणि सचेत असेल तर त्याला 1–2 ग्लास पाणी पाजा. डॉक्टरांशी त्वरित संपर्क साधा. **2. श्वासावाटे आत घेणेः** श्वासावाटे आत घेतल्यास रुग्णाला त्वरित मोकळ्या हवेत न्या आणि त्याला ऊबदार आणि शांत जागेवर ठेवा. जर श्वास सुरु नसेल किंवा श्वास घेण्यात त्रास होत असेल तर तोंडातून तोंडावाटे श्वसन क्रिया करवा आणि ऑक्सिजन द्या, त्वरित डॉक्टरांची मदत घ्या. **3. त्वचेशी संपर्कः** चांगल्या प्रकारे साबुन आणि अधिक पाण्याने केस आणि नखांचा खालचा भाग तसेच शरिराचा प्रभावित भाग धुवून काढावे. दुखणे, लाल येणे किंवा जळजळ चालूच राहिली तर डॉक्टरांशी संपर्क करावा. सर्व दूषित कपडे उपयोग करण्याआधी साबुन आणि पाण्याने धुवून काढावे. **4. डोळ्याच्या संपर्कात आल्यासः** डोळे भरपूर पाणी घेवून हलक्याने कमित कमी 15 मिनिट पर्यंत धुवावे. दुखणे, जळजळ आणि लाल येणे असेच राहिले तर लगेच नेत्र तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

उतारा: कोणताही विशिष्ट उतारा नाही. लक्षणानुसार आणि सहायक उपचार करावे.

झाडांना विषबाधाः निर्धारित प्रमाणात प्रयोग केलात तर झाडाला विषबाधा होत नाही.

साठवणीसाठी निर्देशः 1. कीटकनाशकाचे डबे त्याच्या मूळ पॅकिंग मध्ये इतर वस्तू ठेवलेल्या खोली किंवा परिसरापासून लांब वेगळ्या खोली किंवा परिसरात, लहान मुले, पशु आणि पशुखाद्यापासून लांब किंवा एका वेगळ्या कपाटात कुलूप लावून ठेवावे. 2. कीटनाशक साठवणीकरता असलेल्या खोल्या, जागा चांगल्या उजेडाच्या, चांगल्या बांधलेल्या, कोरड्या, थंड, हवा खेळती राहाण्याच्या आणि पुरेशा क्षेत्रफळाच्या असाव्यात.

प्रयोगकर्त्यांसाठी खबरदारीः 1. या उत्पादनाचा वापर करताना खाऊपिऊ नये, धूम्रपान करू नये आणि पान खाऊ नये. 2. हे उत्पादन हाताळताना लांब बाह्यांचे शर्ट, फुल पँट, रसायन प्रतिरोधक हातमोजे, गॉगल्स आणि बूट घालावे. 3. उत्पादन हाताळल्यानंतर आणि खाण्यापिण्या आणि धूम्रपान करण्यापूर्वी हात आणि शरीराचे उघडे भाग व्यवस्थित धुवावे. वापरानंतर दूषित कपडे काढून टाका आणि वेगळे धुवा.

दक्षताः 1. लेबल आणि पावतीवर लिहिले नसल्यास प्रयोग पीक आणि रोगावर करू नये. 2. पावतीवर उल्लेख केल्यानुसार प्रयोगानंतर कंटेनर (डबे) नष्ट करून टाकावे. 3. हे उत्पादन रेशमाच्या किड्यांसाठी विषारी आहे, त्या पिकांनंतर मलबरीच्या बागा लावू नका जिथे क्लोरएंट्रानिलीप्रोलवर आधारित फॉर्म्यूलेशनचा वापर पानांवर किंवा मातीत केला गेला आहे.

वापरलेले डबे, उपकरणे धुतलेले पाणी आणि उरलेले कीटनाशक यांची विल्हेवाटः 1. कीटनाशकांचे रिकामे डबे आणि उरलेलं कीटनाशक नष्ट करणं आणि सुरक्षितपणे डबे धुणं ही कीटनाशक तयार करणारे, निर्माते आणि वापरणाऱ्यांची जबाबदारी आहे ज्यामुळे पर्यावरण आणि जल प्रदूषण होणार नाही. 2. रिकामी पॅकेजिस फाडून–तोडून, वस्तीपासून दूर जागी पुरून टाकावीत. 3. वापरून रिकामी झालेली पॅकेजिस पुनः वापली जाऊ नयेत म्हणून उघड्यावर ठेवू नयेत.

Shakti Fertt
Insecticide

CHLORANTRANILIPROLE 0.4% W/W GR

शक्ति फर्ट

क्लोरऐन्ट्रानिलिप्रोल 0.4% भार/भार जी आर
कीटनाशक

READ INSTRUCTIONS BEFORE USE

"Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet."

इस लेबल/लीफलेट में दी गई फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग करना मना है।

Marketed by:

INDORAMA
Indorama India Private Limited
Ecocenter, EM-4, 12th Floor, Unit No. ECSL 1201, Sector V, Salt Lake, Kolkata - 700091, West Bengal, India

In case of any suggestions / complaints kindly write to The Manager CRM, Indorama India Private Limited,
Ecocenter, EM-4, 12th Floor, Unit No. ECSL 1201, Sector V, Salt Lake, Kolkata - 700091, West Bengal, India,
Email: shaktiman@in.indorama.com, **Toll Free No.** 1800 180 5244

विपणनकर्ता :
इंदोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
इकोसेंटर, EM-4, 12वीं मंजिल, यूनिट नं० : ECSL 1201, सेक्टर–5, साल्ट लेक, कोलकाता–700091, पश्चिम बंगाल, भारत

Manufactured By :
Samarthman Agro Chem Ltd.
(AN ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015 COMPANY)
Plot No. 853, Village Parakhandauli, Deva Road, Barabanki- 225123(U.P)

निर्माता :
समर्थमान एग्रो केम लिमिटेड
(AN ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015 COMPANY)
प्लाट न. 853, गांव पाराखंदुली देवा रोड, बाराबंकी, उ.प्र.–225123

For Agricultural Use Only.
केवल कृषि उपयोग के लिए।

శక్తి ఫెర్ట్

క్లోరఏంట్రానిలిప్రోల్ 0.4 శాతం భా/భా జి.ఆర్.
కీటకనాశిని

[illegible]

రసాయన మిశ్రమం:

పదార్థం	శాతం భా/భా
క్లోరఏంట్రానిలిప్రోల్ ఏ.ఐ.	0.40 శాతం భా/భా
పాలిఅక్రిలిక్ యాసిడ్	0.40 శాతం భా/భా
నీరు	0.40 శాతం భా/భా
డోడిసిల్ హైడ్రోక్సీపాలి (ఆక్సీ-1,2-ఇథానిడైయిల్) ఫాస్ఫేట్	0.40 శాతం భా/భా
కాల్షియం అగ్నోసల్ఫోనేట్	1.00 శాతం భా/భా
డై బ్లూ	0.05 శాతం భా/భా
టాల్క్ పౌడర్	8.00 శాతం భా/భా
ఇసుక	క్యూ.ఎస్ శాతం భా/భా
మొత్తం:	100.00 శాతం భా/భా

మోతాదు:

పంట	కీటకం సాధారణ నామం	మోతాదు/హెక్టారు ఏ.ఐ. (గ్రా.)	సూత్రీకరణ (కేజీ.)	నీటిలో మిశ్రమం	చివరి పిచికారి నుండి కోతకు మధ్య వేచి ఉండే సమయం (రోజులు)	ప్రతిసారి ఉపయోగించిన తరువాత తిరిగి ప్రవేశించే సమయం (గంటల్లో)
చెరకు	[illegible]	75	18.75	[illegible]	147	-
వరి	[illegible]	40	10	[illegible]	53	-

[illegible]

சக்தி ஃபெர்ட்

குளோரான்ட்ரானிலிப்ரோல் 0.4% எ/எ ஜி.ஆர்.
பூச்சிக்கொல்லி மருந்து

[illegible]

ரசாயனச் சேர்க்கை:

பாகங்களின் பெயர்கள்	% எ/எ
குளோரான்ட்ரானிலிப்ரோல் ஏ.ஐ.	0.40% எ/எ
பாலிஅக்ரிலிக் அமிலம்	0.40% எ/எ
தண்ணீர்	0.40% எ/எ
டோடெசில் ஹைட்ராக்ஸிபாலி (ஆக்ஸி-1,2-எத்தனிடியல்) பாஸ்பேட்	0.40% எ/எ
கால்சியம் லிக்னோசல்பேட்	1.00% எ/எ
நீலச்சாயம்	0.05% எ/எ
டால்க் பவுடர்	8.00% எ/எ
மணல்	QS % எ/எ
மொத்தம்:	100.00% எ/எ

பயிர்	பூச்சியின் பொதுப் பெயர்	ஏ.ஐ. (கிராம்)	பார்முலேஷன் (கிலோ)	நீரில் கரைசல்	கடைசித் தெளிப்புக்கும் அறுவடைக்கும் இடையே காத்திருக்கும் காலம் (நாட்கள்)	மறுநுழைவு காலம்
கரும்பு	[illegible]	75	18.75	[illegible]	147	-
நெல்	[illegible]	40	10	[illegible]	53	-

[illegible]

ಶಕ್ತಿ ಫರ್ಟ್

[illegible]

ಬೆಳೆ						
ಕಬ್ಬು	[illegible]	75	18.75	[illegible]	147	-
ಭತ್ತ	[illegible]	40	10	[illegible]	53	-

[illegible]

ശക്തി ഫർട്ട്

[illegible]

കരിമ്പ്	[illegible]	75	18.75	[illegible]	147	
നെല്ല്	[illegible]	40	10	[illegible]	53	

[illegible]

ଶକ୍ତି ଫର୍ଟ

[illegible]

ଆଖୁ	[illegible]	75	18.75	[illegible]	147	
ଧାନ	[illegible]	40	10	[illegible]	53	

[illegible]

শক্তি ফার্ট

ক্লোরেন্ট্রানিলিপ্রোল 0.4% ওজন/ওজন জি.আর.
কীটনাশক

[illegible]

রাসায়নিক গঠন:

উপাদান	% ওজন/ওজন
ক্লোরেন্ট্রানিলিপ্রোল এ.আই.	0.40% ওজন/ওজন
পলিঅ্যাক্রিলিক অ্যাসিড	0.40% ওজন/ওজন
জল	0.40% ওজন/ওজন
ডোডেসিল হাইড্রক্সিপলি (অক্সি-1,2-ইথানেডাইল) ফসফেট	0.40% ওজন/ওজন
ক্যালসিয়াম লিগ্নোসালফোনেট	1.00% ওজন/ওজন
ডাই ব্লু	0.05% ওজন/ওজন
ট্যালক পাউডার	8.00% ওজন/ওজন
বালি	পর্যাপ্ত মাত্রা % ওজন/ওজন
মোট:	100.00% ওজন/ওজন

ব্যবহার:

ফসল	কীটের নাম	প্রতি হেক্টরে মাত্রা এ.আই. (গ্রাম)	গঠন (কেজি)	জলের পরিমাণ	শেষ প্রয়োগের সময় এবং ফসল কাটার মধ্যে সময়ের ব্যবধান (দিন)	পুনঃ প্রবেশ
আখ	[illegible]	75	18.75	[illegible]	147	
ধান	[illegible]	40	10	[illegible]	53	

[illegible]

শক্তি ফের্ট

ক্ল'ৰেন্ট্ৰানিলিপ্ৰ'ল 0.4% w/w GR
কীটনাশক

[illegible]

ৰাসায়নিক সংৰচনা:

উপাদানসমূহৰ নাম	% w/w
ক্ল'ৰেন্ট্ৰানিলিপ্ৰ'ল এ.আই.	0.40% w/w
পলিএক্ৰিলিক এচিড	0.40% w/w
পানী	0.40% w/w
ড'ডিচিল হাইড্ৰক্সিপলি (অক্সি-1,2-ইথেনডাইল) ফছফেট	0.40% w/w
কেলচিয়াম লিগন'ছালফনেট	1.00% w/w
ডাই ব্লু	0.05% w/w
টেল্ক পাউডাৰ	8.00% w/w
বালি	QS % w/w
মুঠ:	100.00% w/w

পৰামৰ্শ:

শস্য	কীটনাশকেৰ সাধাৰণ নাম	ড'জ/হেক্টৰ এ.আই. (গ্ৰাম)	ফৰ্মুলেশ্যন (কি.গ্ৰা.)	পানীত দ্ৰৱ	শেষবাৰ ছটিওৱা আৰু শস্য কটাৰ মাজৰ সময় (দিন)	পুনঃ প্ৰৱেশ
কুঁহিয়াৰ	[illegible]	75	18.75	[illegible]	147	
ধান	[illegible]	40	10	[illegible]	53	

[illegible]